

## KULLANMA TALİMATI

### ZOLEXOL %1 krem

#### Haricen uygulanır.

- **Etkin madde:**

1 gram kremde, 10 mg oksikonazole eşdeğer miktarda oksikonazol nitrat içerir.

- **Yardımcı maddeler:**

Stearik asit, likit parafin, stearil alkol, sorbitan stearat, polisorbitat 60, benzoik asit, propilen glikol, saf su

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

#### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **ZOLEXOL nedir ve ne için kullanılır?**
2. **ZOLEXOL'ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **ZOLEXOL nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **ZOLEXOL'ün saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

#### **1. ZOLEXOL nedir ve ne için kullanılır?**

ZOLEXOL 10g alüminyum tüp içerisinde beyaz renkli, homojen görünümlü, opak bir kremdir. ZOLEXOL oksikonazol etkin maddesi içermektedir. Oksikonazol, mantar hücrelerinin

çevresini oluşturan zarın oluşumunda önemli olan ergosterol adı verilen maddenin sentezini engelleyerek etki göstermektedir. ZOLEXOL, topikal antifungal bir ilaçtır. Derinizde mantar üremesini önler.

ZOLEXOL mantar enfeksiyonlarının bulunduğu ekstremitelere, vücut, başın saçlı kısımları ve dış genital organlara ve kıvrımlı cilt bölgelerine uygulanabilir.

## **2. ZOLEXOL'ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

### **ZOLEXOL'ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eğer;

- ZOLEXOL'ün etkin maddesine ya da içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (hipersensitivite) varsa,

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

### **ZOLEXOL'ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

- ZOLEXOL, gözler ve vajina (kadın üreme organı) ile temas etmemelidir.
- ZOLEXOL, doktor tarafından önerilmediği takdirde diğer topikal ilaçlar ile aynı zamanda kullanılmamalıdır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

### **ZOLEXOL'ün yiyecek ve içecek ile kullanılması:**

ZOLEXOL deriye uygulandığından yiyecek ve içecek etkisi yoktur.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

ZOLEXOL hamilelikte ancak doktor gerekli gördüğü takdirde kullanılabilir.

*Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Topikal uygulanan oksikonazol, anne sütüne geçer. Bu dönemde ilaç kullanıp kullanamayacağınıza risk/yarar ilişkisini değerlendirdikten sonra doktorunuz karar verecektir.

### **Araç ve makine kullanımı**

ZOLEXOL'ün araç ve makina kullanımı üzerine etkisi yoktur.

### **ZOLEXOL'ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler:**

ZOLEXOL 1gram kremde 115 mg propilen glikol içermektedir. Bu nedenle ciltte iritasyona neden olabilir.

ZOLEXOL 1gram kremde 2 mg benzoik asit içermektedir. Bu nedenle deriye, göze ve mukoz membranlarına hafif derecede iritandır.

ZOLEXOL 1gram kremde 40 mg stearyl alkol içermektedir. Bu nedenle bölgesel deri tepkimelerine (örneğin temasla ortaya çıkan deri hastalığı (kontakt dermatite)) neden olabilir.

### **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

Doktorunuz önermediği takdirde, diğer topikal ilaçları ZOLEXOL ile aynı zamanda kullanmayınız.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. ZOLEXOL nasıl kullanılır?**

#### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

ZOLEXOL'ü daima doktorunuzun söylediği gibi alınız. Emin olmadığınız durumlarda doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

ZOLEXOL'ü mantar hastalığından etkilenen bölge ve çevresine günde 1 veya 2 defa uygulayınız. Hastalığın tekrarlamasını önlemek amacıyla, ayakta oluşan mantar tedavisinde 1 ay ve vücudun diğer bölgelerinde oluşan mantar tedavisinde 2 hafta süreyle kullanmaya devam ediniz.

#### **Uygulama yolu ve metodu:**

Krem hafifçe parmakla ovularak emdirilir.

Genital bölgedeki mantar tedavisine, olası alkol iritasyonunu (tahriş) önlemek amacıyla, ürünün önce krem formu ile başlanmalı ve çözelti ile devam edilmelidir.

#### **Değişik yaş grupları:**

#### **Çocuklarda kullanımı:**

12 yařın altındaki çocuklarda mantar enfeksiyonlarının nadir olarak görölmesine karřın, bu hastalıkların tedavisinde ZOLEXOL krem etkili bir řekilde kullanılabilir.

**Yařlılarda kullanımı:**

ZOLEXOL'ün yařlılarda özel kullanımı yoktur.

**Özel kullanım durumları:**

**Böbrek/Karaciğer yetmezliđi:**

ZOLEXOL'ün böbrek ve karaciğer yetmezliđi olan hastalarda özel kullanımı yoktur.

*Eđer ZOLEXOL'ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduđuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

**Kullanmanız gerekenden daha fazla ZOLEXOL kullandıysanız:**

*Kullanmanız gerekenden daha fazla ZOLEXOL kullandıysanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz ya da hastaneye başvurunuz.*

**ZOLEXOL'ü kullanmayı unutursanız**

ZOLEXOL'ü kullanmayı unutursanız bu dozu atlayın ve daha sonra diđer doz zamanında ilacı kullanmaya devam edin.

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.*

**ZOLEXOL ile tedavi sonlandırıldıđında oluşabilecek etkiler**

Doktorunuza danıřmadan tedaviyi sonlandırmayınız.

**4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi ZOLEXOL içeriđinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkilere neden olabilir.

**Ařađdakilerden biri olursa ZOLEXOL'ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- İlacın uygulandıđı bölgede kızarıklık, kařıntı, yanma hissi,
- Nefes darlıđı,
- Solunum sıkıntısı,
- Bođaz/gırtlak bölgesinde řiřkinlik hissi ve duyu kaybı,
- Göğüste sıkıřma hissi,

- Vücutta aşırı sıcaklık/soğukluk hissi,
- Boğulma hissi,
- Burun ve gözde kaşıntı,
- Burun akıntısı,
- Hapşırma,
- Vücutta kaşıntılı kızarıklık/kabarıklık,
- Karın ağrısı, bulantı, kusma,
- Baş dönmesi,
- Bayılma hissi,
- Kalpte çarpıntı.

*Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ZOLEXOL'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.*

#### **Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:**

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın	:10 hastanın en az 1 inde görülebilir.
Yaygın	:10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan	:100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek	:1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek	:10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor	:Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

#### **Deri ve deri altı doku hastalıkları:**

Yaygın: Kaşıntı, yanma

Yaygın olmayan: İritasyon, alerjik temasla ortaya çıkan deri hastalığı (alerjik kontakt dermatit), kıl kökü iltihabı, deride kızarıklık, kabarıklık, çatlak, döküntü, batma hissi veya beze (nodül).

Bunlar ZOLEXOL'ün hafif yan etkileridir.

#### Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

#### **5. ZOLEXOL'ün saklanması**

*ZOLEXOL'ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

25°C' nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ZOLEXOL 'ü kullanmayınız.*

#### ***Ruhsat Sahibi:***

Farma-Tek İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Şerifali Mah. Bayraktar Bulvarı

Beyan Sok. No:12

34775 Ümraniye/İstanbul

#### ***Üretim Yeri:***

Pharmactive İlaç San. ve Tic. A.Ş

ÇOBS, Karaağaç Mah., Fatih Bulvarı No:32

Kapaklı/Tekirdağ

***Bu kullanma talimatı 16/02/2016 tarihinde onaylanmıştır.***